COSMO
CHIRURGIA

tel: + 385 1 4873 023
e-mail: info@cosmochirurgia.hr
Adresa: Gradišćanska 34, 10 000 Zagreb

INFORMIRANI PRISTANAK ZA FACELIFT

Ime pacijenta: _____

Datum: _____

Obaviješten/a sam da imam sljedeće stanje/stanja:

SPUŠTANJE I OPUŠTANJE MEKIH TKIVA LICA I VRATA

Facelift

1. Facelift je estetski kirurški zahvat kojim se nastoji smanjiti znakove starenja, poput bora i opuštene kože lica i vrata. Iako facelift općenito daje mlađi izgled, nije moguće precizno predvidjeti točan rezultat, npr. “izgledati 10 godina mlađe.” Stupanj poboljšanja ovisi o dobi, genetici, strukturi kostiju, karakteristikama kože i osobnim navikama poput pušenja, konzumacije alkohola i prehrane.
2. Potpuno sam iskreno informirao/la liječnika o motivima za operaciju i shvaćam da novi izgled ne jamči poboljšanje života.
3. Facelift neće ukloniti sitne bore oko očiju i usana niti promjene boje kože ili mrlje.
4. Ako koristim duhan, razumijem da to može zakomplicirati operaciju, anesteziju, cijeljenje, rezultat i trajnost učinka.
5. Pacijenti koji koriste duhan često se tretiraju manje agresivno zbog potencijalnih problema s cijeljenjem. To može rezultirati manjkom zatezanja kože u području čeljusti ili brade, što može zahtijevati buduću korekciju ili utjecati na trajnost rezultata.
6. Svjestan/na sam da ovo nije mali kirurški zahvat.
7. Facelift neće zaustaviti proces starenja. Budući zahvati mogu biti potrebni ovisno o kozmetičkim kriterijima. Rezultati mogu odstupati od očekivanja.

Privremene sekvele

Nakon facelift operacije mogu se pojaviti privremene sekvele koje obično nestaju same, ali ponekad zahtijevaju daljnji tretman:

- Crvenilo, promjena boje kože ili paučinaste vene na vratu, koje ponekad zahtijevaju tretman.
- Oteklina ili zategnutost vrata, moguća primjena steroida ili ultrazvuka.

COSMO CHIRURGIA

tel: + 385 1 4873 023
e-mail: info@cosmochirurgia.hr
Adresa: Gradišćanska 34, 10 000 Zagreb

- Bore lica ili vrata mogu ostati vidljive, a smjer bora može se promijeniti zbog zatezanja kože.
- Zategnutost i čvrstoća ispod brade, koja može trajati tjednima ili mjesecima, ponekad se tretira steroidnom injekcijom ili ultrazvukom.
- Preostala naborana koža ispod brade, osobito kod oštećene kože od sunca; može se tretirati skin pilingom.

Kirurške značajke

1. Facelift se obično izvodi na jednoj strani lica, a zatim na drugoj. Rezovi se postavljaju prema procjeni kirurga, unutar linije kose, oko uha i prema zatiljku ili vratu. Mali rez ispod brade može biti potreban za uklanjanje viška kože, masnoće i zatezanje mišića vrata.
2. Koža se odvaja od masnog tkiva i mišića, nježno se zateže te se uklanja višak kože. Ponekad se uklanja masno tkivo ispod brade i korigiraju dublji slojevi lica i vrata.
3. Rezovi se postavljaju duž prirodnih linija kože i bora; ožiljci obično blijede, ali mogu biti trajni i eventualno zahtijevati korekciju.

Postoperativni period

1. Nakon operacije stavljaju se zavoji na lice i vrat u trajanju 24 sata.
2. Uobičajena nelagoda kontrolira se lijekovima.
3. Oteklina i modrice su česte, mogu trajati 2–3 tjedna; glava treba biti povišena. Potpuno nestajanje oteklina može potrajati 6 mjeseci.
4. Može se javiti utrnulost kože, obično prolazna (6–12 mjeseci), rijetko trajna.
5. Nakon operacije izbjegavati naporne aktivnosti i vježbanje.

Rizici i komplikacije

1. Odgođeno cijeljenje, rijetko nekroza kože koja zahtijeva dodatni zahvat.
2. Infekcija i lokalni hematomi; rijetko hospitalizacija.
3. Loše cijeljenje i trajni ožiljci, eventualno korekcija.
4. Krvarenje rijetko zahtijeva transfuziju.
5. Oštećenje živaca: senzorne i motoričke funkcije (npr. podizanje obrva) mogu biti privremene ili trajne.
6. Lokalni gubitak kose, vidljivi rezovi.

COSMO CHIRURGIA

tel: + 385 1 4873 023
e-mail: info@cosmochirurgia.hr
Adresa: Gradišćanska 34, 10 000 Zagreb

7. Položaj uške može varirati nakon facelifta.
8. Kombinacija s kemijskim pilingom može povećati rizik od problema s cijeljenjem.

Nema jamstva rezultata

1. Nemoguće je točno predvidjeti rezultat, a postoje rizici od neuspjeha, recidiva ili potrebe za dodatnim zahvatima.
2. Pacijent je informirao liječnika o svojoj medicinskoj i socijalnoj anamnezi.
3. Potrebna je potpuna suradnja s liječnikom; nesuradnja može biti opasna.
4. Liječniku se ovlašćuje korištenje profesionalne prosudbe ako se pojave nepredviđene okolnosti tijekom operacije.
5. Rezultati ovise o genetici, životnom stilu i prirodi starenja; revizijski zahvat može biti potreban.

Pristanak

Potvrđujem da sam pročitao/la i razumio/la ovaj pristanak i da su svi prazni dijelovi popunjeni prije potpisa. Dajem svoj dragovoljni pristanak za operaciju.

Potpis pacijenta (ili zakonskog skrbnika): _____

Potpis liječnika: _____

Datum: _____